

Posiadacz zezwolenia:

BIOFA AG, BIO-FARMING-SYSTEMS, Rudolf-Diesel-Str. 2, D - 72525 Münsingen, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 07381/ 9354-15, fax: +49 07381/ 9354-5

***Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska***

Madex MAX

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i
nieprofesjonalnych.**

Zawartość substancji czynnej:

>3 x 10¹³ jednostek *Cydia pomonella* Granulosis Virus (CpGV - entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae) **6,24 g/l**

Zezwolenie MRiRW nr R-11/2012 wu z dnia 20.12.2012 r.



Drażniący

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

I OPIS DZIAŁANIA

Madex®MAX zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkowieczki (*Cydia pomonella*). Madex®MAX jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy owocówki jabłkowieczki, zakażenie przez kontakt nie jest możliwe. Po spożyciu zakażone larwy zaprzestają żerowania i nie powodują dalszych szkód. W zależności od ilości spożytej substancji, larwy giną w ciągu kilku dni lub w trakcie ich dalszego rozwoju. Madex®MAX jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1.Drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza)

owocówka jabłkowieczka

Środek stosować od wylęgu pierwszych larw

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

0,05 l na hektar na metr wysokości korony drzew, w maksymalnie 400 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

0,05 l na hektar na metr wysokości korony drzew, w maksymalnie 400 litrach wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – **10**

Zaleca się wykonanie 5 zabiegów na jedno pokolenie gąsienic

Odstęp między zabiegami: **minimum 8 dni.**

Zalecana ilość wody: 400 l/ha na metr wysokości korony drzewa

W zależności od warunków pogodowych oraz stopnia nasilenia szkodnika, zaleca się aby zabieg powtórzyć po 8 dniach słonecznych.

Uwagi:

Zaleca się stosować środek wieczorem.

Zaleca się dodanie do cieczy użytkowej cukru, w ilości 0,5 kg na każde 100 l wody.

Środek Madex®MAX zawiera zabezpieczenie substancji czynnej przed promieniowaniem UV.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Preparat można stosować łącznie ze środkami grzybobójczymi (za wyjątkiem miedziowych) oraz ze środkami owadobójczymi ([za wyjątkiem preparatów silnie kwaśnych i alkalicznych](#)).

Szkody z poprzedniego roku generalnie nie korelują z gradacją szkodnika w aktualnym roku.

Zaleca się stosowanie pułapek feromonowych.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

nie dotyczy

2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

nie dotyczy

3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE

**NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)**

nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Kraków – (0-12) 411 99 99

Lublin – (0-81) 740 89 83

Łódź – (0-42) 657 99 00

Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 44 09

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Warszawa – (0-22) 619 08 97

Wrocław – (0-71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Produkt przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 5°C.

Okres ważności – 3 lata

Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -