

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: (+48, 22) 326-06-01. fax: (+48, 22) 326-06-99

Producent środka ochrony roślin: Syngenta Supply AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11. fax: (+41,61) 323-12-12.

**W celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska
należy postępować zgodnie z etykietą.**

D I V I D E N D X T R A 0 3 0 F S

Zawartość substancji czynnej:

difenokonazol - związek z grupy triazoli - 30 g w 1 litrze środka (2,84%)

Zezwolenie MRiRW nr R- [157](#) /2013 z dnia [28](#) . [11](#) .2013 r.



Uwaga

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku dostania się na skórę, umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA

DIVIDEND XTRA 030 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych w celu zwalczania chorób grzybowych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Jęczmień

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.

2013 r.

Pasiastość liści jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg nasion.

Pszenica

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.

Septorioza plew pszenicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 187,5 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 187,5 ml/100 kg nasion.

Śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg nasion.

Śnieć karłowa pszenicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg nasion.

Żyto

Zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion.

Zalecana ilość wody: 0 – 1200 ml/100 kg ziarna.

UWAGI:

1. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności do 16%.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
5. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
7. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika zaprawiarki napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

2013 r.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Wodę użytą do mycia aparatury oraz rozcieńczone resztki cieczy użytkowej zagospodarować zgodnie z zasadą dotyczącą płynnych pozostałości.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie: nie dotyczy.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0–30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

2013 r.

Nr partii -

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - [157](#) – /2013 z dnia [28.11](#) ____.