

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 204/2013d z dnia 23.08.2013 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 87/2012 z dnia 25.06.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

BASF SE, Carl - Bosch - StraÙe 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
tel.: (22) 570 99 99, fax.: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

OSIRIS 65 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – **37,5 g/l (3,7%),**

metkonazol (związek z grupy triazoli) – **27,5 g/l (2,7%).**

**Zezwolenie MRiRW nr R- 87/2012 z dnia 25.06.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 204/2013d z dnia 23.08.2013 r.**



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

ZBOŻA OZIME

1. Pszenica ozima

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.

2. Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.

3. Żyto ozime

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.

4. Jęczmień ozimy

rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ZBOŻA JARE

1. Jęczmień jary

rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

1. Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 2,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew i łamliwości źdźbła oraz ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła.
2. Środek stosowany w pszenicy ozimej w dawce 1,5 l/ha ogranicza występowanie fuzariozy kłosów i łamliwości źdźbła.
3. Środek stosowany w pszenżycie ozimym w dawce 1,5 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania czerni zbóż, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
4. W celu osiągnięcia najwyższej skuteczności zwalczania następujących chorób: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosów, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, septoriozy paskowanej liści i rynchosporiozy zbóż stosować wyższą dawkę środka.

STOSOWANIE ŁĄCZNE

W celu zwiększenia skuteczności działania środek Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha można stosować łącznie ze środkiem Corbel 750 EC w następującym zakresie:

1. Pszenica ozima

mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosów, septorioza plew

2. Pszenżyto ozime

septorioza plew

3. Jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

4. Jęczmień jary

rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa

Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

Osiris 65 EC 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Terminy stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, **maksymalnie dwa razy w sezonie**, z zachowaniem odstępu 21 dni pomiędzy zabiegami:

- **pszenica ozima, pszenżyto ozime**: od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65);
- **żyto ozime**: od fazy liścia flagowego do początku fazy kłoszenia (BBCH 37-51);
- **jęczmień ozimy**: od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-37);
- **jęczmień jary**: od fazy drugiego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 32-51).

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica – **35 dni**

Jęczmień – **35 dni**

Pszenżyto – **35 dni**

Żyto – **35 dni**

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

W celu ochrony organizmów wodnych należy stosować strefę ochronną o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

V PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04	Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99	Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83	Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00	Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46	Wrocław – (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -