

Posiadacz zezwolenia:

Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii,  
tel. (+32) 04/385 97 11, fax: (+32) 04/385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów,  
tel. (48) 668 04 71, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

\*CYPERKILL MAX 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-55/2012 z dnia 19.03.2012 r.

znaki ostrzegawcze:

Xn - Szkodliwy

N - Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Działa drażniąco na skórę

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się  
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

#### OPIS DZIAŁANIA

CYPERKILL MAX 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania  
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania  
szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

## ZASTOSOWANIE ŚRODKA

### ROŚLINY ROLNICZE

pszenica ozima, pszenica jara

- mszyca zbożowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mleczonej ziarna (pszenica w fazie BBCH 59-73)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

- skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

jęczmień jary

- skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Środek stosować od początku wylęgania się larw (jęczmień w fazie BBCH 39-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

ziemniak

- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha

Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

rzepak ozimy

- ślodyszek rzepakowy

- chowacz czterozębny - ograniczenie występowania

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

- chowacz podobnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67),

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

ROŚLINY WARZYWNE

kapusta głowiasta

- gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

groch ogrodowy

- mszyca grochowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (groch w fazie BBCH 19-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

por

- wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha

Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (por w fazie BBCH 11-47)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni

Zalecana ilość wody 200-600 l/ha

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Uwagi:

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:

- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.  
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

#### SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.  
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki - | 14 DNI, |
| rzepak ozimy -                                            | 49 DNI, |
| kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, por -                | 7 DNI.  |

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY.

#### OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

#### OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

## PIERWSZA POMOC

Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane płukanie żołądka.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04

Rzeszów - (17) 866 40 25

Kraków - (12) 411 99 99

Sosnowiec - (32) 266 11 45

Lublin - (81) 740 89 83

Tarnów - (14) 631 54 09

Łódź - (42) 657 99 00

Warszawa - (22) 619 66 54

Poznań - (61) 847 69 46

Wrocław - (71) 343 30 08

## PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.  
Chronić przed dostępem wilgoci.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....