

Posiadacz zezwolenia:

Sharda Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 886 9328, fax: 22 846 8735; e-mail: shardain@vsnl.com

OGRODNIK AE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

imidachlopyrd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – **0,025% (0,25 g/l)**

Zezwolenie MRiRW nr R - 236/2014 z dnia 08.12.2014 r.



Uwaga

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P261 – Unikać wdychania par.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Ogrodnik AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspersera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym zwalczania szkodników w niektórych roślinach ozdobnych uprawianych pod osłonami lub w gruncie.

W roślinie działa systemicznie.

STOSOWANIE ŚRODKA

Świerk

świerkowiec większy (syn. misecznik miechun)

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika i powtórzyć po 4-7 dniach. Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 4-7 dni**

Gerbera (pod osłonami - w szklarniach lub trwałych tunelach foliowych)

mączlik szklarniowy

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Chryzantema ogrodowa (w szklarniach lub trwałych tunelach foliowych)

mszyca wielożerna, wciornastek amerykański

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Kawowiec (w szklarniach lub trwałych tunelach foliowych)

wełnowiec cytrusowiec

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W czasie opryskiwania w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne.
2. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Środka nie stosować:
 - podczas silnego wiatru,
 - w czasie silnego nasłonecznienia.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Zachować ostrożność - środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczoł (okres zapobiegający zatruciu):

30 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła w temperaturze 0°C - 30°C.

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -