Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'affaires de Crécy, 2 rue Claude chappe, 69370 Saint Didier au Mont D'or, Republika Francuska, tel: +33 (0)4 78 64 32 60 (standard), fax: +33 (0)4 78 47 25 45.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.fnagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,
tel.: 32 745 11 12, www.agropak.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

PROLECTUS 50 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fenpyrazamina (związek z grupy pyrazoli) - **50% (500 g/kg)**

Zezwolenie MRiRW nr R- 12/2015 z dnia 27.01.2015 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
PROLECTUS 50 WG jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania

zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (truskawka), sadowniczych (brzoskwinia, nektaryna) oraz ręcznych (truskawka, pomidor, bakłażan, papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce).

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY SADOWNICZE
Truskawka
szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki (BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Brzoskwinia, nektaryna
brunatna zgnilizna drzew pestkowych (kwiaty, pędy).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha
Środek ogranicza występowanie choroby.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach co 7-14 dni.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

brunatna zgnilizna drzew pestkowych (owoce).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy BBCH 75 (owoce osiągnęły 50% typowej dla gatunku wielkości do fazy BBCH 87 (owoce dojrzałe do zbioru), najpóźniej 1 dzień przed zbiorem. Maksymalnie wykonać 3 zabiegi, w odstępach co najmniej 7 dni.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie brzoskwini i nektaryny: 3

ROŚLINY WARZYWNE (w uprawie pod osłonami).
Pomidor, bakłażan, papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce.
szara pleśń.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,12%
Zalecana stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 0,12% (80 - 120 g środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na roślinach od fazy BBCH 61 (otwarty pierwszy kwiat) do fazy BBCH 87 (70% owoców uzyskało typową barwę).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l/1000m^2.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia, nie przekraczając dawki środka 0,12 kg/1000m^2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie produkcyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Wielokrotne stosowanie tego samego środka lub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. Dlatego środek należy stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

3. W wyniku stosowania środka nie można wykluczyć obniżenia jakości plonu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy truskawki
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie następujących stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych

tereny o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%:	tereny zagrożone spływem powierzchniowym tj. o nachyleniu terenu powyżej 2%:
strefa ochronna o szerokości 1 m	zadarniona strefa ochronna o szerokości 10 m

W przypadku uprawy brzoskwini i nektaryny
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie następujących stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych

tereny o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%:	tereny zagrożone spływem powierzchniowym tj. o nachyleniu terenu powyżej 2%:
- strefa ochronna o szerokości 10 m lub - strefa ochronna o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - strefa ochronna o szerokości 3 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%	zadarniona strefa ochronna o szerokości 10 m

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Truskawka - **1 dzień**
Brzoskwinia, nektaryna - **1 dzień**
Pomidor, bakłażan, papryka, warzywa dyniowate (pod osłonami) - **1 dzień**

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- przechowywać w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .....
Zawartość netto - .....
Nr partii - .....