Posiadacz zezwolenia:
Agrofarm Sp. z o.o. ,ul. Inflancka 5, lok.42 ,00 – 189 Warszawa, tel.:/fax: +48 (22) 810-11-37
e-mail: biuro@agrofarm.pl

AGROTALONIL 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) - **500 g/l** (39.09%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 40 /2015 z dnia 15 .04.2015 r.

Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Agrotalonil 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ogórka i pomidora (w uprawie pod osłonami) przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ogórek (pod osłonami)
mączniak rzekomy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml środka w 100 litrach wody lub 40 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4% (200-400 ml środka w 100 litrach wody lub 20-40 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby (od fazy kiedy na pędzie głównym rozwiniętych jest 9 lub więcej liści - skala 2-stopniowa lub na pędzie głównym rozwinięty 9 liść-skala 3-stopniowa do początku fazy rozwoju owoców – pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą: BBCH 19 109- 71) następnie co 7-10 dni. Wykonywać 2-3 zabiegi w sezonie.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **1200-1500 l/ha (120-150 l/1000 m^2 lub 12-15l/100 m^2)**
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej **7 -10 dni**

Pomidor (pod osłonami)
zaraza ziemniaka
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 ml środka w 100 litrach wody lub 30 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3% (200-300 ml środka w 100 litrach wody lub 20-30 ml środka w 10 litrach wody).
Wyższe stężenie cieczy użytkowej stosować w razie większego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo od fazy otwartego pierwszego kwiatu (BBCH 69 619) do fazy kiedy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość (BBCH 72 702).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **1200-1500 l/ha (120-150 l/1000 m^2 lub 12-15l/100 m^2)**
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej **7 -10 dni**
Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

Uwagi:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w szklarniach z izolowaną powierzchnią glebową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, płucząc trzykrotnie wodą. Opłukać wewnętrzną powierzchnie zbiornika przy użyciu ciśnieniowego urządzenia płuczącego lub ręcznie, zużywając objętość wody ok. 5% pojemności zbiornika. Włączyć pompę i przy zamkniętych rozpylaczach otworzyć odpowiednie zawory, aby przepłukać wszystkie elementy układu cieczowego. Z uzyskaną cieczą użytkową należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy pozostałymi po zabiegu. Powtórzyć tę czynność dwukrotnie.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pomidor, ogórek – **3 dni**

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

– przechowywać w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .....
Zawartość netto - .....
Nr partii - .....